

APLICACIONES EN EL MAIZ:

Si es posible bañar la semilla durante 24 horas a razón de 2 litros de FLORAVIT con 2 litros de agua para 100 Kg. de semilla una vez seca sembrar.

1.- Tratamiento cuando la planta tiene 20 cm de altura (2-4 hojas) a razón de 3 litros/Ha. (se puede usar junto con los herbicidas de post-emergencia).

2.- Tratamiento cuando la planta tiene una altura de 60 cm a la dosis de 10 litros/Ha. (se puede usar junto con el tratamiento del TALADRO)

IMPORTANTE

- Si no se hacen tratamientos a los 60 cm entonces utilizar 15 l /Ha al principio cuando la plantas tiene entre 2 y 5 hojas.
- RIEGO POR ASPERSION:
 - 3 litros/ Ha. Cuando la planta tiene una altura de 20 cm.
 - 5 litros/ Ha. Cuando la planta tiene una altura de 50 cm.
 - 10 litros / Ha. Cuando empiece a apiñar la planta.

(Apartar el FLORAVIT DURANTE LOS ULTIMOS 3 MINUTOS DEL RIEGO DEL ASPERSOR) para riego con Pivots o en extensiones a manta consultar con los servicios técnicos.

MODO DE UTILIZACIÓN

- Trigo y cebada: aplicar a partir de la formación del primer nudo, siempre que el cultivo esté en fase de desarrollo a razón de 10 l / Ha.
- Cebada cervecera: La aplicación dosis y forma van en función del grado de almidón que se obtiene habitualmente (consultar servicios técnicos).
- Pratenses: Aplicar cuando el cultivo esté entre 10-12 cm de altura normalmente, después de la primera siega a razón de 10 L/ Ha. En aplicación única.
Cuando el aprovechamiento del cultivo es para la semilla la aplicación se realizará unos 20 días antes de la floración, a la misma dosis.